

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งและถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกรายในปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่จะรักษาเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีสไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระจง ค่าง คาว ฯลฯ

คนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ที่เป็นโรคคนสามารถติดโรคจากสัตว์เหล่านี้ได้ 2 ทางคือ

1. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัดหรือเลียจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด
2. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย โดยปกติคนถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลียจะไม่ติดโรคจากสัตว์เหล่านั้นนอกเสียจากว่าบริเวณที่ถูกเลียจะมีบาดแผลหรือรอยถลอกหรือรอยขีดข่วนโดยคนนั้นไม่ได้สังเกต ในกรณีนี้จะทำให้สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้รวมทั้งถูกเลียที่ริมฝีปากหรือนัยน์ตา

- สุนัขหรือแมวที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าได้ ยกเว้นสุนัขที่ตั้งท้อง โดยจะฉีดทุกปีและสามารถฉีดยาคุมกำเนิดได้ โดยยาคุมกำเนิด 1 เข็มจะคุมกำเนิดได้ 5-6 เดือน (ฉีด 2 เข็ม/ปี)

คนที่เป็โรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการอย่างไร ?

ในระยะ 2-3 วันแรก อาจมีไข้ต่ำ ๆ ต่อไปจะมีอาการเจ็บคอเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คันทหรือปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณแผลที่ถูกกัดทั้งๆที่แผลอาจหายเป็นปกติแล้วต่อไปจะมีอาการตื่นเต้นง่าย กระสับกระส่าย ไม่ชอบแสงสว่างไม่ชอบลม และไม่ชอบเสียงดัง กลืนลำบากแม้จะเป็นของเหลวหรือน้ำเจ็บมากเวลากลืนเพราะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนแต่ยังมีสติพูดจารู้เรื่องต่อไปจะอะอะมากขึ้นและสุดท้ายอาจมีอาการชักเป็นอัมพาตหมดสติและเสียชีวิตเนื่องจากส่วนที่สำคัญของสมองถูกทำลายไปหมด



ข้อควรปฏิบัติภายหลังจากถูกสุนัขบ้าหรือสัตว์ที่สงสัยว่าบ้ากัด

1. ล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาด ฟอกด้วยสบู่ 2-3 ครั้งแล้วทาแผลด้วยน้ำยาเบตาดีน หรือแอลกอฮอล์หรือทิงเจอร์ ไอโอดีนแล้วรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที
2. ถ้าสุนัขตายให้นำซากมาตรวจถ้าหากสุนัขไม่ตายให้ขังไว้ดูอาการ 10 วันขณะเดียวกันให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส่วนการรักษาทางสมุนไพรหรือแพทย์แผนโบราณไม่สามารถป้องกันโรคได้ไม่ควรรอดูอาการสุนัข เพราะอาจสายเกินไปที่จะฉีดวัคซีน
3. ในกรณีที่ติดตามสัตว์ที่กัดไม่ได้ เช่น เป็นสัตว์ป่า สัตว์จรจัด สัตว์กัดแล้วหนีไป หรือจำสัตว์ที่กัดไม่ได้จำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีน
4. ผู้ที่ต้องมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือมีบาดแผล ไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนหรือมีเลือดไหล แผลถลอกหรือแผลลึกรวมทั้งผู้ที่ถูกสุนัขเลียที่นัยน์ตา ริมฝีปาก และผิวหนังที่มีแผลถลอกส่วนในกรณีที่ถูกเลียผิวหนังที่ไม่มีแผลหรือเพียงแต่อู่มสุนัขไม่สามารถจะติดโรคได้

สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการ อย่างไร ?

พบได้ 2 แบบคือ

1. แบบดุร้าย มีอาการหงุดหงิด ไล่กัดคนและสัตว์
อื่น ๆ ถ้าถูกโซ่หรือกักขังไว้ในกรง จะกัดโซ่ กรง
หรือสิ่งของที่อยูใกล้อย่างดุร้ายบางครั้งสุนัขจะกัด
จนฟันหักหรือลั่นเป็นแผล มีเลือดออก เมื่อแสดง
อาการดุร้ายได้ 2-3 วัน ก็จะอ่อนเพลียงลง ขาหลัง
ไม่มีแรง เดินโซเซ และตายในที่สุด


2. แบบเซื่องซึม มีอาการปากอ้าหุบไม่ได้ ลิ้นมีสี
แดงคล้ำบางครั้งมีสิ่งสกปรกติดอยู่และลิ้นห้อย
ออกมานอกปาก มีอาการคล้ายกระดูกติดคอโดย
เจ้าของมักจะเอามือล้วงแต่ไม่พบกระดูกสุนัขจะเอา
ขาหน้าตะกุกบริเวณแก้มปากและคอบวม สุนัขจะ
ลุกนั่ง ยืน และเดินไปมาบ่อย ๆ กินของแปลก ๆ
เช่น ใบไม้ ก้อนหิน หรือบางตัวจะกินปัสสาวะของ
ตัวเอง ไม่กัดถ้าไม่ถูกรบกวน สุนัขแบบหลังนี้จะ
สังเกตอาการยากมาก ดังนั้นหากสุนัขตายโดยไม่
ทราบสาเหตุ ควรตัดหัวไปพิสูจน์ก่อน

ควรฉีดป้องกันในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข
แมว เป็นต้นโดยสัตว์เลี้ยงที่ฉีดควรมีอายุมากกว่า 3
เดือนขึ้นไป



ด้วยความปรารถนาดีจาก
งานสาธารณสุข สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
โทร 0 42 416 157

โรคพิษสุนัขบ้า



จัดทำโดย

งานสาธารณสุข สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง